



200 PLANTAS DE INTERIOR

by J. Bilbao

200 Plantas de Interior

Indice

- Clásicas “todo terreno” y purificadores (fáciles de cuidar) ---- (Imágenes 01-10)
- Plantas de follaje llamativo ----- (Imágenes 11-20)
- Suculentas y plantas de bajo riego ----- (Imágenes 21-30)
- Palmeras y plantas tropicales ----- (Imágenes 31-35)
- Florales de interior ----- (Imágenes 36-40)
- Helechos y plantas de humedad ----- (Imágenes 41-44)
- Otros géneros relevantes ----- (Imágenes 45-50)
- Variedades específicas y populares de interior ----- (Imágenes 51-100)
- Carnívoras ----- (Imágenes 101-105)
- Bonsáis de interior (especies adaptadas) ----- (Imágenes 106-115)
- Plantas de acuario (adaptadas a interior húmedo) ----- (Imágenes 116-125)
- Plantas acuáticas decorativas (estanques interiores) ----- (Imágenes 126-130)
- Bobinas y colgantes especiales ----- (Imágenes 131-140)
- Orquídeas exóticas ----- (Imágenes 141-160)
- Bromelias tropicales ----- (Imágenes 161-170)
- Cactus grandes y suculentas destacadas ----- (Imágenes 171-180)
- Raras y de colección ----- (Imágenes 181-190)
- Misceláneas únicas ----- (Imágenes 191-200)

POTOS

Epipremnum aureum

FAMILIA

Araceae

ORNAMENTAL INTERIOR



LUZ

indirecta,
mínima



RIEGO

moderado



SUELO

bien drenado



TEMPERATURA

15–25 °C



SANSEVIERIA

Dracaena trifasciata

FAMILIA

Asparagacecea

ORNAMENTAL INTERIOR



LUZ

indirecta
mínima



RIEGO

escaso



SUELO

bien drenado



TEMPERATURA

15–30 °C



ZAMIOCVLCA

Zamioculcas zamifolia

FAMILIA

Araceae

ORNAMENTAL INTERIOR



LUZ

indirecta,
mínima



RIEGO

moderado



SUELO

bien drenado



TEMPERATURA

18–26 °C



CINTA

Chlorophytum comosum

FAMILIA

Asparagacecea

ORNAMENTAL INTERIOR



LUZ

indirecta,
parcial



RIEGO

moderado



SUELO

bien drenado



TEMPERATURA

18–24 °C



ESPATIFILO

Spathiphyllum spp.

FAMILIA

Araceae

ORNAMENTAL INTERIOR



LUZ

indirecta,
parcial



RIEGO

moderado



SUELO

bien drenado



TEMPERATURA

18-27 °C



FICUS BENJAMINA

Weeping Fig

FAMILIA

Moraceae

ORNAMENTAL INTERIOR



indirecta,
abundante



RIEGO
moderado



SUELO
bien drenado



TEMPERATURA
16-24 °C



Drácena marginata

Drácena de Madagascar



ILUMINACIÓN: Luz brillante indirecta

RIEGO: Permitir secar el sustrato
entre riegos

HUMEDAD: Moderada

TEMPERATURA: 18°C - 27°C

Dracaena fragrans

Palo de Agua



ILUMINACIÓN: Luz brillante indirecta

RIEGO: Cuando el sustrato se seque 2-3 cm

HUMEDAD: Moderada

TEMPERATURA: 18°C – 24°C

Ficus elastica

Caucho



ILUMINACIÓN: Luz brillante indirecta

RIEGO: Dejar secar los primeros 2-3 cm del sustrato

HUMEDAD: Moderada

TEMPERATURA: 15°C- 24°C

Hiedra

Hedera helix



ILUMINACIÓN: Luz indirecta baja a moderada

RIEGO: Mantener húmedo el sustrato

HUMEDAD: Moderada

TEMPERATURA: 10°C – 24°C

Costilla de Adán

Monstera deliciosa



ILUMINACIÓN: Luz indirecta moderada

RIEGO: Cuando el sustrato seque 2-3 cm

HUMEDAD: Moderada

TEMPERATURA: 18°C - 27°C

Ficus lyrata

Higuera de hoja de violín



ILUMINACIÓN: Luz brillante indirecta

RIEGO: Cuando el sustrato seque 2-3 cm

HUMEDAD: Moderada

TEMPERATURA: 18°C–24°C

Calathea

spp.



ILUMINACIÓN: Luz indirecta baja a moderada

RIEGO: Mantener húmedo el sustrato

HUMEDAD: Alta

TEMPERATURA: 18°C – 24°C

Maranta spp.



ILUMINACIÓN: Luz indirecta baja a moderada

RIEGO: Mantener húmedo el sustrato

HUMEDAD: Alta

TEMPERATURA: 18°C– 27°C

Aglaonema spp.



ILUMINACIÓN: Luz indirecta baja a moderada

RIEGO: Dejar secar los primeros 2-3 cm

HUMEDAD: Alta

TEMPERATURA: 18°C – 27°C



Croton

Codiaeum variegatum



ILUMINACIÓN: Luz indirecta moderada

RIEGO: Cuando el sustrato seque 2-3 cm

HUMEDAD: Moderada

TEMPERATURA: 15°C – 26°C

Alocasia spp.



ILUMINACIÓN: Luz indirecta baja a moderada

RIEGO: Mantener húmedo el sustrato

HUMEDAD: Alta

TEMPERATURA: 18°C – 27°C

Dieffenbachia spp.



ILUMINACIÓN: Luz indirecta baja a moderada

RIEGO: Mantener húmedo el sustrato

HUMEDAD: Alta

TEMPERATURA: 18°C – 27°C

Aspidistra elatio



ILUMINACIÓN: Luz indirecta baja a moderada

RIEGO: Cuando el sustrato seque 2-3

HUMEDAD: Moderada

TEMPERATURA: 10°C – 27°C

SYNGONIUM PODOPHYLLUM

Pata de ganso

FICHA TÉCNICA

FAMILIA Araceae

ORIGEN Centroamérica

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Mantener
el suelo
humedo

TEMPERATURA 16-30°C

SUSTRATO Tierra de
uso general



ALOE VERA

Sábila

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Asphodelaceae

ORIGEN

Península arábiga

LUZ

Luz indirecta
y brillante

RIEGO

Secar entre riegos

TEMPERATURA 15-25 °C

SUSTRATO Tierra de
cactus



CRASSULA OVATA

Planta de jade

FICHA TÉCNICA

FAMILIA Crassulaceaa

ORIGEN Sudáfrica

LUZ

Lue indirecta
y brillante

RIEGO

Regar entre riegos

TEMPERATURA

15-24°C

SUSTRATO Tierra de
uso general



SENECIO ROWLEYANUS

Collar de perlas

FICHA TÉCNICA

FAMILIA Astaracea

ORIGEN África austral


LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO

Secar entre riegos

TEMPERATURA 18–24°C

SUSTRATO Tierra de cactus



CEROPEGIA WOODII

Cadena de corazones

FICHA TÉCNICA

FAMILIA Apocynacea

ORIGEN Sudafrica

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar entre
riegos

TEMPERATURA 16-26 °

SUSTRATO

Tierra bien drenada



KALANCHOE spp.

FICHA TÉCNICA

FAMILIA Crassulaceaa

ORIGEN Madagascar

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Regar
entre riegos

TEMPERATURA
15-25°C

SUSTRATO

Tierra bien
drenada



ECHEVERIA spp.

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Crassulaceae

ORIGEN

México

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar entre
riegos

TEMPERATURA

16–24 °C

SUSTRATO bien
drenado



HAWORTHIA spp.

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Asphodelaceae

ORIGEN

Sudáfrica

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
18–26 °C

SUSTRATO Bien drenado



BEAUCARNEA RECURVATA

Palma de cola de caballo

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Asparagaceae

ORIGEN

Mexico

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
18-27 °C

SUSTRATO Bien drenado



EUPHORBIA spp.

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Crassulaceae

ORIGEN

Madagascar

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA

15-24 °C

SUSTRATO Bien
drenado



YUCCA spp.

FICHA TÉCNICA

FAMILIA
Asparagaceae

ORIGEN
México

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
15–28 °C

SUBSTRATO Bien drenado



CHAMAEDOREA ELEGANS

Palmera de salón

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Arecaceae

ORIGEN

México

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
18-26 °C

SUSTRATO Bien drenado



DYPSIS LUTESCENS

Palmera areca

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Arecaceae

ORIGEN

Madagascar

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
18–26 °C

SUSTRATO Bien drenado



HOWEA FORSTERIANA

Palmera de kentia

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Arecacea

ORIGEN

Australia

LUZ Luz indirecta

y brillante

RIEGO Secar

entre riegos

TEMPERATURA

18 - 27 °C

SUSTRATO Bien drenado



PHOENIX ROEBELEENII

Palmera de Laos enana

FICHA TÉCNICA

FAMILIA
Arecaceae

ORIGEN
Laos

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
18–27°C

SUSTRATO Bien drenado



RHAPIS EXCELSA

Palmera china

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Arecaceae

ORIGEN

China

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
15-25 °C

SUSTRATO Bien drenado



ANTHURIUM ANDRAEANUM

Anturio

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Araceae

ORIGEN

Sur de Colombia
y Ecuador

LUZ Luz.indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA 18-24 °C

SUSTRATO Bien drenado



PHALAENOSIS SPP.

orquídea

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Orchidaceae

ORIGEN

Asia tropical

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
18-26 °C

SUSTRATO Bien drenado



SAINTPAULIA

Violeta africana

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Gesneriaceae

ORIGEN

África oriental

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
18-24 °C

SUSTRATO Bien drenado



CLIVIA MINIATA

Clivia

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Amarylliaceae

ORIGEN

Sudáfrica

LUZ Luz indirecta
y brillante

TEMPERATURA

15–25 °C

SUSTRATO

Bien drenado



BROMELIACEAE SPP.

Guzmania, Vriesea

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Bromeliaceae

ORIGEN

América tropical

**LUZ Luz indirecta
y brillante**

**RIEGO Secar
entre riegos**

**TEMPERATURA
15–24 °C**

SUSTRATO Bien drenado



NEPHROLEPIS EXALTATA

Helecho de Boston

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Lomariopsidaceae

ORIGEN

América tropical

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
15-24°C

SUSTRATO Bien drenado



NEPHROLEPIS OBLITERATA

Helecho Kimberly Queen

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Nephrolepidaceae

ORIGEN

Australia

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
15-24 °C

SUSTRATO Bien drenado



ASPÁRAGUS SPP.

Helecho espárrago

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Asparagaceae

ORIGEN

Africa y Asia

LUZ

Luz indirecta
y brillante

RIEGO

Secar
entre riegos

TEMPERATURA

15 - 24 °C

SUSTRATO

Bien drenado



POLYPODIACEAE SPP.

Pluma de Brasil

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Polypodiaceae

ORIGEN

Régiones tropicales

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
15 -24 'C

SUSTRATO Bien drenado



HOYA CARNOSA.

Planta de cera

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Apocynaceae

ORIGEN

Asia

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
15-24°C

SUSTRATO Bien drenado



PILEA

PEPEROMIOIDES

Planta china del dinero

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Urticaceae

ORIGEN

China

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA
15–24 °C

SUSTRATO Bien drenado



TRADESCANTIA ZEBRINA

Matalí de hoja de cebra

FICHA TÉCNICA

FAMILIA

Commelinaceae

ORIGEN

México y Centro-
américa

LUZ Luz indirecta
y brillante

RIEGO Secar
entre riegos

TEMPERATURA

10-30°C

SUSTRATO Bien drenado



Tillandsia spp.

Plantas del aire

Familia

Bromeliaceae

Orígenes:

Niños de
América
tropical

Ubicación

Alta humedad,
solo directo

Riego

Por inmersión cada
2 a 3 semanas

Temperatura

15 a 30 °C

Altura

5 a 30 cm



Cyclamen persicum

Violeta de Persià

Familia

Primulaceae

Origenes

Regiones del
Mediterràneo

Riego

Regular, 1 vez
por semana

Temperatura

5 a 20 °C

Altura

20 a 30 cm



Philodendron spp.

Filodendo

Familia

Araccae

Origenes

Bosques
tropicales

Riego

Cada semana

Altura

+30 cm

Temperatura

18 a 30 °C



Sansevieria 'Laurentii'

Dracaena trifasciata 'Laurentii'

Lengua de suegra

Familia

Asparagaceae

Orígenes

Africa occidental

Luz

Alta drémesis,
sin sol directo

Riego

Cada semana

Temperatura

15 a 30 °C

Altura

60 a 90 cm



Sansevieria cylindrica

Dracaena angolensis

Espada de San Jorge

Familia

Asparagaceae

Orígenes

África occidental

Luz

Alta

sin sol directo

Riego

Cada Semana

Temperatura

15 a 30 °C

Altura 60 a 90 cm



Monstera adansonii

Costilla de Adán

Familia
Araraceceae

Orígenes
Africa
trópicatel

Luz
Alta drémesis,
sin sol directo

Riego
Cada Semana

Temperatura
18 a 30 C

Altura



30 a 50 cm
60 a 80 cm

Monstera deliciosa 'Variegata'

Costilla de Adán

Familia
Araceae

Orígenes
América
tropical

Luz
Alta
sin sol directo

Riego
Cada semana

Temperatura 60 a 30 C

Altura 60 a 90 cm



Potos 'Marble Queen'

Epipremnum aureum

'Marble Queen'

Familia

Araceaea

Orígenes

Asia

Luz

Alta

sin sol directo

Riego

Cada semana

Temperatura

18 a 30 C

Altura

60 a 120 cm

60 a 80 cm

Substrato Bien drenado



Potos 'Neon'

Epipremnum aureum 'Neon'

Familia
Araceae

Orígenes
Asia

Luz
Alta
sin sol directo

Riego

Temperatura
18 a <30 C

Altura 60 a 120 cm



Aglaonema 'Silver Bay'

Aglaonema commutatum
'Silver Bay'

Familia
Araceae

Orígenes
Asia

Luz
Alta
sin sol directo

Riego
Cada semana

Temperatura
18 a <30 C

Altura 90 a 120 cm



Calathea orbifolia

Familia
Marantaceae

Orígenes
América
tropical

Luz
Alta drémesis,
sin sol directo

Riego
Substrato
húmedo

Temperatura
18 a <30 °C

Altura 60 a 90 cm



Calathea lancifolia (Rattlesnake Plant)

Familia
Marantaceae

Orígenes
América
tropical

Luz
Alta
sin sol directo

Riego
Substrato
húmedo

Temperatura
18 a <30 C

Altura 60 a 90 cm



Calathea medallion

Familia
Marantaceae

Orígenes
América
tropical


Luz
Alta drémesis,
sin sol directo

Riego
Substrato
húmedo

Temperatura
18 a <30 C

Altura

60 a 90 cm



Ficus elastica 'Tineke'

Familia
Moraceae


Orígenes
Asia

Luz
Alta drémesis,
sin sol directo

Riego
Cada semana

Temperatura
18 a <30 C

Altura 90 a 180 cm



Ficus elastica 'Ruby'

Familia
Moraceae

Orígenes
Asia

Luz
Alta drémesis,
sin sol directo

Riego
Cada semana

Temperatura
18 a <30 C

Altura 90 a 180 cm



Peperomia obtusifolia

(*Peperomia de hojas redondeadas*)

FAMILIA:
Piperaceae

ORÍGENES:
América tropical

LUZ:
Indirecta brillante

RIEGO:
Moderado

TEMPERATURA:
18–24 °C

Substrato: Ligero y suelto



Peperomia argyreia

(Watermelon Peperomia)

FAMILIA:
Piperaceae

ORÍGENES:
América
tropical

LUZ:
Indirecta brillante

RIEGO:
Moderado

SUMPERATURA:
18–24°C

ALTURA: 30 cm



Peperomia caperata 'Rosso'

FAMILIA:
Piperaceae

ORÍGENES:
América
tropical

LUZ:
Indirecta

TEMPERATURA:
18- 24°C

ALTURA: 25 cm



Tradescantia pallida

(Purple Heart)

FAMILIA:
Piperaceae

ORÍGENES:
América
tropical

LUZ:
Moderato

TEMPERATURA:
10–24 °C

SUSTRATO:
Bien drenado

ALTURA: 30 cm



Tradescantia nanouk



FICHA TÉCNICA

- 🌿 Familia: Commelinaceae
- 🌱 Orígenes: América
- ☀️ Luz: luz brillante indirecta
- 💧 Riego: moderado
- 🌡️ Temperatura: entre 15–25 °C
- 🌱 Substrato: bien drenado
- Altura: 20–40 cm

Begonia rex



FICHA TÉCNICA



Familia: Begoniaceae



Origenes: Asia



Luz: luz brillante indirecta



Riego: moderado



Temperatura: entre 15–21 °C



Altura: 30–45 cm



BEGONIA MACULATA

(Polka Dot Begonia)



FAMILIA

Begonlaceae

ORÍGENES

Brasil

LUZ

Sombra parcial

TEMPERATURA

18–30°C

RIEGO

Moderado

SUSTRATO

Con buen drenaje

ALTURA

30–100 cm



PHILODENRON HEDERACEUM

(Heartleaf Philodendron)



RIEGO

Moderado

FAMILIA

Araccae

ORIGENES

America tropical

LUZ

Sombra parcial

TEMPERATURA

18-27°C

SUBSTRATO

Con buen
drenaje

ALTURA

30-60 cm



PHILODENDRON BIRKIN



RIEGO

Moderado

FAMILIA

Araceae

ORÍGENES

América del Sur

LUZ

Sombra parcial

TEMPERATURA

18–24°C

SUSTRATO

Con buen
drenaje

ALTURA

50–100 cm



PHILODENDRON BRASIL



RIEGO

Moderado

FAMILIA

Araceae

ORIGENES

América del Sur

LUZ

Sombra parcial

TEMPERATURA

18–30°C

SUBSTRATO

Con buen
drenaje

ALTURA

30–100 cm



PHILODENDRON MICANS

(Heartleaf Philodendron)



RIEGO

Moderado

FAMILIA

Araceae

ORÍGENES

Mexico

LUZ

Sombra parcial

TEMPERATURA

16-24°C

SUBSTRATO

Con buen
drenaje

ALTURA

30-100 cm



PHILODENDRON GLORIOSUM

(Heartleaf Philodendron)



RIEGO

Moderado

FAMILIA

Araceae

ORÍGENES

Colombia

LUZ

Sombra parcial

TEMPERATURA

18–24°C

SUBSTRATO

Con buen
drenaje

ALTURA

90–150 cm



PHILODENDRON PINK PRINCESS



FAMILIA

Araceae

ORÍGENES

Sudamérica

LUZ

sombra parcial

TEMPERATURA

18–24^oC

RIEGO

Moderado

SUSTRATO

Con buen
drenaje

ALTURA

30–60 cm

SYNGONIUM 'NEON ROBUSTA'



RIEGO

Moderado

FAMILIA

Araceae

ORÍGENES

Central y
sur America

LUZ

Sombra parcial

TEMPERATURA

18-24°C

SUSTRATO

Con buen
drenaje

ALTURA

30-90 cm



SYNGONIUM 'PIXIE'



RIEGO
Moderado

FAMILIA
Araceae

ORIGENES
Central y
Sur America

LUZ
Sombra parcial

TEMPERATURA
18-24 °C

SUBSTRATO
Con buen
drenaje

ALTURA
20-30 cm



ALOCASIA POLLY

(Elephant Ear)



RIEGO

Mantener el
sustrato
húmedo

FAMILIA

Araceae

ORÍGENES

Asia tropical

LUZ

Luz filtrada o
sombra parcial

TEMPERATURA

18–24°C

SUSTRATO

Con buen
drenaje

ALTURA

30–60 cm



ALOCASIA ZEBRINA (Elephant Ear)



FAMILIA
Araceae

ORÍGENES
Asia tropical

LUZ
Luz filtrada o
sombra parcial

TEMPERATURA
18–24°C

RIEGO
Mantener el
sustrato
húmedo

SUSTRATO
Con buen
drenaje

ALTURA
60–90 cm



Alocasia amazonica

FICHA TÉCNICA

Familia: Araceae

Orígenes: Híbrido de cultivadores tropicales

Luz Abundantemente luminosa, sin sol directo

Riego Moderada, mantener el sustrato homedo

Temperatura 16-26 °C

Sustrato Ligero y con buen drenaje

Altura 1 m



DIEFFENBACHIA 'CAMILLE'



FICHA TÉCNICA

Familia: Araceae

Origenes: Zona
tropical de América

Luz:
Sombra Parcial

Riego: Moderado

Temperatura:

15-27 ° C

Sustrato:

bien drenada

Altura: Hasta 1 m

Dieffenbachia 'Tropic Snow'



Familia: Araceae

Orígenes:

Luz: Indirecta

América tropical

Riego: Regular, sin encharcar

Temperatura: 17–27°C

Sustrato: Bien drenado

Altura: 80–150 cm



HOYA SSP



FAMILIA:
Apecynaceae

LUZ:
Luz indirecta

RIEGO: Moderado
Secarse subtrato
entre riegos

ORÍGENES:
Asla

TEMPERATURA:
15 a 23 °C

SUBSTRATO:
Bien drenado

ALTURA:
Hasta 2 m en tiesto

HOYA KERRII

(HOYA CORAZÓN)

**FAMILIA:**

Apecynaceae

LUZ:

Luz indirecta

RIEGO:

Secarse subtrato
entre riegos

ORIGENES:

Asia

TEMPERATURA:

15 a 28 °C

SUBSTRATO:

Bien drenado

ALTURA

Hasta 4 m en tiesto



HOYA PUBICALYX

**FAMILIA:**

Apoćynaceae

LUZ:

Luz indirecta

RIEGO:

Secarse subtrato
entre riegos

ORÍGENES:

Asia

TEMPERATURA:

16 a 28 °C

SUSTRATO:

Bien drenado

ALTURA:

Hasta 5m en tiesto

Cissus rhombifolia

Grape Ivy



FAMILIA

Vitaceas

LUZ

Indirecta brillante

ORÍGENES

Sudamerica

TEMPERATURA

15–25°C

RIEGO

Moderado

SUSTRATO

Blen drenado



Columnnea gloriosa

PLANTA PEZ DE ORO

FAMILIA

Gesneriaceas

ORÍGENES

América tropical

LUZ

Brillante e
indirecta

RIEGO

Abundante,
manteniendo
el sustrato húmedo

TEMPERATURA

18 - 24 °C



ALTURA

Hasta 80 cm



SUSTRATO

Poroso y con
buen drenaje



Dischidia nummularia




Familia	Apocynaceae
Orígenes	Sudeste asiático, Queensland
Luz	Indirecta brillante
Riego	Moderado
Temperatura	18–30 °C
Substrato	Bien drenado
Altura	30–90 cm



Epiphyllum anguliger

(Fishbone Cactus)



Familia	Cactaceae
Orígenes	México
Luz	Indirecta brillante
Riego	Moderado
Temperatura	15–25 °C
Substrato	Bien drenado
Altura	50–70 cm



RHIPSALIS BACCIFERA



Familia Cactaceae



Origenes Africa, América tropical



Luz Moderada



Riego Moderado



Temperatura De 15 a 30°C



Altura (en tiesto) 50 cm



Sedum morganianum

Cola de burro

Ficha técnica



Familia:
Crassulaceae



Origen:
México



Luz:
Indirecta
o filtrada



Riego:
Moderado



Temperatura:
18-25 °C



Substrato:
Bien drenado



Altura:
30-60 cm



Senecio radicans

(String of Bananas)



Familia: Asteraceae

Origenes: Sudáfrica

Luz: A plena luz, sin sol directo

Riego: Moderado, dejando secar el sustrato

Temperatura: Entre 18 y 24 °C todo el año

Substrato: Poroso, con buen drenaje

Altura: 30-60 cm (en tiesto)

Senecio herreianus

(String of Watermelons)



Familia: Asteraceae

Origenes: Sudáfrica

Luz: A plena luz, sin sol directo

Riego: Moderado, dejando secar síustro

Temperatura: Entre 18 y 24 °C

Substraio: Poroso, con buen drenaje

Altura: 30-60 cm (en tiesto)

Tillandsia ionantha



Familia: Bromeliaceae

Origenes: México y América Central

Luz: Abundante, indirecta

Riego: Moderado, por nebulización

Temperatura: Entre 15 y 30 °C

Substrato: No necesario

Altura: 10-20 cm (en tiesto)

TILLANDSIA XEROGRAPHICA



- 🌿 **FAMILIA:** Bromellaceae
- 🌍 **ORIGENES:** Mexico+ Guatemala, El-salvador
- 💧 **LUZ:** Luz abundante, indirecta
- 💧 **RIEGO:** Sumergir una vez cada 2-3 semanas
- 🌡️ **TEMPERATURA:** 18-90+°C
- 🪴 **SUSTRATO:** No necesario




TILLANDSIA CAPUT-MEDUSAE



- 🌿 **FAMILIA:** Bromeliaceae
- 📍 **ORIGENES:** México, America Central
- 💧 **LUZ:** Luz abundante, indirecta
- 💧 **RIEGO:** Sumergir una vez cada 1-2 semanas
- 🌡️ **TEMPERATURA:** 16-20°C




TILLANDSIA ANDREANA



- ⌘ FAMILIA: Bromeliacea
- © ORIGENES: Colombia
- LUZ: Luz abundante indirecta
- 💧 RIEGO: Sumergir una vez cada 1-2 semanas
- 💰 TEMPERATURA 18-20°C



Tillandsia tectorum



familia	Bromeliáceas
origenes	Los Andes
luz	Luz muy ábundante
riego	Escaso, por nebulización
temperatura	18–24°C
sustrato	Ligero, bien drenado



Kalanchoe tomentosa

Familia Crassulaceae	Origenes Madagascar
Luz Luz parcial	Riego Bajo
Temperatura 15-25 °C	Substrato Sustrato bien drenante
Altura Hasta 45.cm	



Kalanchoe blossfeldiana

Familia	Crassulaceae
Orígenes	Madagascar
Luz	Luz brillante indirecta
Riego	Moderado, dejando secar el sustrato entre riegos
Temperatura	15 -25°C
Substrato	Bien drenado
Altura	Hasta 30 cm



Dionaea muscipula – Venus atrapamoscas

Familia	Droseraceae
Origenes	Costa este de EE. UU.
Luz	Luz indirecta
Riego	Moderada, dejando secar un poco el sustrato
Temperatura	15–30°C
Substrato	Pobre en nutrientes
Altura	Hasta 20 cm



Drosera capensis

– Rocío del sol

Familia	Droseraceae
Orígenes	Sudafrica
Luz	Luz indirecta
Riego	Constante sin secar el sustrato
Temperatura	15-25°C
Substrato	Pobre en nutrientes
Altura	Hasta 30 cm



Nepenthes alata

Planta jarro tropical



Familia
Nepentháceas



Luz
brillante indirecta



Orígenes
Filipinas



Temperatura
15-25 °C



Riego
moderado



Substrato
para plantas
camívoras

Sarracenia purpurea

Planta trompeta



Familia
Sarraceniáceas



Luz
plena a parcial



Origenes
America del Norte



Temperatura
5-25°C



Riego
abundante



**Altura en
tiesto**
15-25 cm

Pinguicula moranensis

Planta mantequera



Familia
Lentibulariáceas



Luz
plena a parcial



Orígenes
México



Temperatura
15–25 °C



Riego
moderado



Substrato
para plantas
carnívoras



Ficus retusa

Bonsái de ficus



Familia
Moráceas



Luz
plena o parcial



Origenes
Asia tropical



Temperatura
15–30 °C



Riego
abundante



**Altura en
tiesto**
15–70 cm

Bonsái Serissa foetida

Árbol de mil estrellas



Família
Rubiaceas



Luz
liena a parcial



Orígenes
Asia



Temperatura
10–29 °C



Riego
moderado



**Altura en
tíesto**
15–50 cm

Bonsái

Carmona microphylla

Té de Fukien



Familia: Boragináceas

Luz:

indirecta y abundante

Riego:

moderado, sin encharcar

Altura en peste:

20-30 cm

Orígenes:

Asia tropical

Temperatura:

16-25°C

Sústrato:

tierra drenada

Bonsái

Ligustrum japonicum

Ligustro



Familia: Oleáceas

Luz:

indirecta o abundante

Riego: moderado

Altura en tiesto:

30-60 cm

Orígenes:

Japón

Temperatura:

10-25°C

Sustrato:

drenado



Bonsái

Zelkova serrata

Bonsái olmo japonés



Familia: Ulmáceas

Luz: indirecta

Riego: moderado

Altura en tiesto:

25-60 cm

Orígenes:

Este Asia,

Temperatura:

12-21* C

Sustrato:

drenado

Bonsái
Ulmus parvifolia
Olmo chino



Familia: Ulmáceas

Luz: indirecta

Riego: moderado

Altura en tiesto:

30–70 cm

Orígenes:

China

Temperatura:

12–22°C

Sustrato:

drenado

Schefflera arboricola

Bonsai paraguas



35-45cm

Familia: Araliáceas

Orígenes: Taiwán

Luz: Luz abundante sin sol directo

Riego: Moderado, dejar secar ligeramente entre riegos

Temperatura: 15-25 °C

Sustrato: Mezcla bien drenado

Juniperus procumbens

'Nana': Enebro



25-30cm

Familia: Cupresáceas

Orígenes: Japón

Luz: Abundante, sol directo opcional

Riego: Moderado, evitar excesos

Temperatura: 10-25 °C

Sustrato: Mezcla bien drenado

Pyracantha coccinea

Espino de fuego



35-50cm

Familia: Rosáceas

Orígenes: Europa y Asia

Luz: Abundante, sol directo

Riego: Moderado, evitando echarcamientos

Temperatura: 4-25°C

Sustrato: Mezcla bien drenado

Bonsái Acer palmatum 'Atropurpureum'

Arce rojo bonsái



Familia

Sapindaceae



Origenes

Japon, Corea, China



Luz

Abundante,



Riego

Moderado,



Temperatura

10-20 °C



Substrato

Bien drenado

Anubias barteri



Familia
Araceae



Origenes
Africa occidental



Luz
Moderada,
indirecta



Riego
Constante
substrato húmedo



Temperatura
22-28°C



Substrato
Arena o grava



Altura
20-40cm



Vallisneria spiralis



Familia

Hydrocharitaceae



Origenes

Africa tropical



Luz

Moderada,
indirecta



Riego

Constante,
substrate h medo



Temperatura

20-28 C



Substrato

Arena o grova



Altura

30-60 cm

Microsorium pteropus

Helecho de Java



Familia
Polypodiaceae



Riego
Moderado



Origenes
Sur y sudeste
de Asia



Temperatura
20-26°C



Luz
Luz indirecta
o sombra



Substrato
Bien drenado,
aireado



Altura 30-40 cm

Echinodorus amazonicus



Familia
Allsmatoceae



Origenes
Cuenca del
Amazonas



Luz
Moderada



Riego
Abundante



Temperatura
22-29 °C



Substrato
Rico en nutrientes



Altura
25-40 cm



CRYPTOCORYNE WENDTII



Familia:
Araceae

Luz:
intensaa a baja

Temperatura:
22 a 28 C

Altura:
15 a 20 cm

Orígenes:
Sri Lanka

Riego:
Abundante

Substrato:
rica en nutrientes

CABOMBA CAROLINIANA



	FAMILIA	Cabombáceas
	ORIGENES	Sureste de Estados Unidos, Sudamérica
	LUZ	Media-alta
	RIEGO	Inmersión total
	TEMPERATURA	18-28 °C
	SUSTRATO	Nutritivo, fino
	ALTURA	30-50 cm

BACOPA MONNIERI



	FAMILIA	Plantagináceas
	ORÍGENES	Pantropical
	LUZ	Media-alta
	RIEGO	Abundante
	TEMPERATURA	20–30 °C
	SUSTRATO	Nutritivo, drenado
	ALTURA	20–40 cm

Ludwigia repens



FICHA TÉCNICA

Familia: Onagraceae

Origenes. Sureste
de Estados Unidos
Central America

Luz: Indirecta

Riego: Frecuente

Substrato: Nutritivo

Temperatura: 20-28°C

Altura. 50-80 cm

Hygrophila polysperma



FICHA TÉCNICA

Familia: Acanthaceae	Origenes: Sudeste asiático
Luz: Indirecta brillante o parcialmente soleada	Substrato: Nutritivo y bien drenado
Riego: Frecuente	
Temperatura: 18-23°C	Altura: 30-40.cm


Limnobium laevigatum

Lechuga de agua



FICHA TÉCNICA

Familia: Hydrocharitaceae	Américas central y del Sur
Luz: Indirecta brillante o parcialmente soleada	Sustrato: Nutritivo y fango arenoso
Riego: Frecuente	Altura: 5-15 cm
Temperatura: 18-30°C	



Nymphaea spp. Nenúfar enano

FAMILIA: Nymphaeaceae

ORÍGENES: Tropical y subtropicales

LUZ: Sol acenso

RIEGO: Sumirgado

TEMPERATURA: 18 a 25 0 °C

SUSTRATO: Rico substrato

ALTURA (EN TIESTO): 10 a 30 cm



Ceratophyllum demersum

Cola de zorro acuática

FAMILIA: Ceratophyllaceae

ORIGENES: Zonas templadas
y-tropicales

LUZ: Sol o semisombra

RIEGO: Permanente en agua

TEMPERATURA: 10 a 28 °C

SUSTRATO: Sin sustrato

ALTURA (EN TIESTO): 30 a 100 cm

Eichhornia crassipes

Jacinto de agua



Familia Pontederiaceas

Orígenes America tropical"

Riego Cultivo en el agua

Sustrato Innecesario

Altura 30–50 cm

Luz

Luz muy intensa

Temperatura

64–73°F
(18–23°C)

Marsilea quadrifolia

Trébol acuático



Familia Marsileacea

Orígenes Europa

Riego Cultivao en
agua

Sustrato Innecesario

Altura 20–30 cm

Luz

Luz muy intensa

Temperatura

59–77°F

(16–25°C)



Hydrocotyle leucocephala

Gotu kola acuática



Familia: Araliáceas

Orígenes: América tropical, México

Luz: Intensa, tolera la moderada

Riego: Frecuente, sustrato inundado

Temperatura. 20-28 °C

Sustrato: Rico en materia orgánica

Altura: 30-40 cm

Epipremnum pinnatum

'Cebu Blue'



Familia; Aráceas

Origenes; Asta tropical, Australia

Luz; Intensa, tolera la moderada

Riego; Frecuente

Tempreatura; 18–26 °C

Sustrato; Ligero y b ien drenado

Altura; 80–100 cm



Scindapsus *pictus* 'Argyraeus'



Familia

Araceae



Luz

indirecta
brillante.



Orígenes

Sureste asiático



Riego

Moderado



Temperatura

16–26 °C



Sustrato

Bien drenante, rico
en materia orgánica



Altura

30–20 cm



Dischidia *ovata*



Familia

Riologia



Luz

Lub Indirecta
brillante



Origenes

Sureste asiático



Riego

Moderado



Temperatura

19-20 °C



Sustrato

Bien drenante, rica
en materia orgánica



Altura

30-60 cm



Hoya *linearis*



Familia

Apocihaceas



Luz

indirecta
brillante



Origenes

Himbyrn y sudoeste
de China



Riego

Moderado



Temperatura

10-25-C



Sustrato

Rico en materia
organica



Altura

30-50 cm

Aeschynanthus radicans

Planta lápiz labial



Familia	Gesneriáceas
Origenes	Asia tropical
Luz	Luminosa e indirecta
Riego	Moderado
Temperatura	16–26 °C
Sustrato	Bien drenante
Altura de la planta en tiesto	25–50 cm

Peperomia prostrata

Cadena de tortugas

Familia

Piperáceas

Orígenes

Sudamérica

Luz

Indirecta brillante

Riego

Modérado, dejando secar
él sustrato

Temperatura

18=26 °C

Substrato

Ligero, bien drenado

Altura , 30 cm



Peperomia hope

Familia

Piperáceas

Orígenes

Sudamérica

Luz

Indirecta brillante



Riego

Moderado, dejando
secar el sustrato

Substrato

Ligero, bien
drenado

Temperatura

18-26°C

Altura en tiesto

Aprox,
25 cm

Ficus pumila

Higuera enana



FAMILIA	Moraceae
ORÍGENES	China. Japón, Vietnam
LUZ	A la sombra o con luz indirecta
RIEGO	Moderado
TEMPERATURA	13-24 °C
SUSTRATO	Bien drenado, fértil
ALTURA	Hasta 3 m

Callisia repens 'Pink Panther'



FAMILIA	Commelinaceae
ORIGENES	America tropical y subtropical
LUZ	Mucha luz Indirecta
RIEGO	Moderado
TEMPERATURA	18-24 °C
SUSTRATO	Poroso, bien drenado
ALTURA	Hasta 0.3 m



Columnea hirta

Columnea



FAMILIA	Gesneriaceae
ORÍGENES	América - Central
LUZ	Indirecta
RIEGO	Moderado
TEMPERATURA	16-24 °C
SUSTRATO	Bien drenando, rico orgánico
ALTURA	Hestá 1 m

Dendrophylax lindenii



FAMILIA
Orchidaceae



ORIGENES
Florida, el Caribe



LUZ
indirecta



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
Entre 12 y 33°C



SUBSTRATO
Especial orquideas



ALTURA
Hasta 40 cm



Caleana major



FAMILIA
Orchitaceae



ORIGENES
Australia



LUZ
indirecta



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
Entre 10 - 23 °C



SUSTRATO
Especial orquideas



ALTURA
Hasta 50 cm



Trichocentrum tigrinum



FAMILIA
Orchidaceae



ORIGENES
Mexico,
America Central



LUZ
indirecta



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
Entre 15 y 24°C



SUSTRATO
Especial orquideas



ALTURA
Hasta 50 cm



Bulbophyllum echinolabium



FAMILIA
Orchidaceae



ORIGENES
Sulawesi
(Indonesia),
Borneo



LUZ
indirecta.



RIEGO
Moderado



TEMPERATURA
Entre 18 y 27°C



SUSTRATO
Especial orquideas



ALTURA
Hasta 60 cm



Arundina graminifolia



FICHA TÉCNICA

Familia	Orchidaceae
Origenes	Asia tropical
Luz	Alta, luz indirecta
Riego	Moderado
Temperatura	15–25 °C
Substrato	Orquideas

Epidendrum nocturnum



Altura en tiesto:
40-30 cm

FICHA TÉCNICA

Familia	Orchidaceae
Orígenes	América tropical
Luz	indirecta
Riego	Moderado
Temperatura	15-20°C
Substrato	Corteza, especial orquideas



Fredclarkeara After Dark



FAMILIA

Orchidaceae



LUZ

sin sol directo



ORIGENES

Hibrido



RIEGO

Moderado



TEMPERATURA

18-24 +C



SUSTRATO

Especial orquideas



ALTURA 20 - 40 cm



AERANGIS SPP.



Familia	Orchidaceae
Origenes	Africa tropical
Luz	luminosa e indirecta
Riego	frecuente
Temperatura	entre 15–25 °C
Sustrato	Especial orquideas

PERISTERIA ELATA



Familia	Orchidaceae
Origenes	América tropical
Luz	luminosa e indirecta
Riego	moderado
Temperatura	entre 18-24 °C
Altura	hasta 60 cm



ORNITHOCEPHALUS SPP.



Familia	Orchidaceae
Origenes	America tropical
Luz	luminosa e indirecta
Riego	frecuente
Temperatura	entre 15–25 °C
Altura	hasta 15 cm

CATTLEYA SPP.



Familia	Orchidaceae
Orígenes	América tropical
Luz	luminosa e indirecta
Riego	moderado
Temperatura	entre 18-25 °C
Altura	hasta 60 cm

Dendrobium nobile



Familia Orchidaceae

Orígenes Himalaya, China, Indochina

Luz Mucha luz, luz solar directa evitada

Riego Abundante durante el crecimiento

Temperatura 16–24 °C

Substrato Mezcla para orquídeas epifitas

Altura Hasta 60 cm

Oncidium spp.

Orquídea bailarinas



Familia Orchidaceae

Orígenes América Central, Sudamérica

☀ Luz Moderada

💧 Riego Riegos regulares

🌿 Temperatura 12~25 °C

⚠ Substrato Mezcla para orquídeas épifitas

↕ Altura Hasta 90 cm

Miltoniopsis spp.

Orquídea pensamiento



Familia Orchidaceae

Orígenes Sudamérica

💧 Luz indirecta

💧 Riego Moderado

🌡 Temperatura 15–23 °C

🌿 Substrato Mezcla para orquídeas epifitas

↑ Altura Hasta 50 cm

Paphiopedilum spp.

Orquídea zapatito



Familia Orchidaceae

Orígenes Sureste de Asia

💧 Luz Moderada

💧 Riego Moderado

🌡️ Temperatura 18-24 °C

🌱 Substrato Mezcla para orquídeas

📏 Altura Hasta 60 cm

Vanda coerulea

Orquídea azul



Familia

Orchidaceae

Orígenes

Sudeste de Asia

Luz

Intensa, Indirecta

Riego

Frecuente, evitando encharcar

Temperatura

15-30 °C todo el año

Sustrato

Especial orquídeas

Altura

60-90 cm

Brassia spp.

Orquidea araña



Familia
Otchidaceae

Orígenes
Mexico ta América
tropical

Luz
Intensa, indirecta

Riego
Frecuente, evitando
encharcar

Temperatura
15-30 °C todo el año

Sustrato
Muy àireado
y drenante

Altura
60-50 cm

Cambria spp.



Familia
Orchidaceae

Origenes
Híbridos

Luz
Intensa, indirecta

Riego
Frecuente, evitando
encharcar

Temperatura
15-25 °C todo el año

Sustrato
Muy aireado y
drenante

Altura 50-63.cm

Ludisia discolor

– Orquídea joya



Familia: Orchidaceae

Orígenes: Sudeste asiático

Luz: Indirecta

Riego: Moderado

Temperatura: 16-25 °C

Substrato: Rico en humus, bien drenado

Altura: 15-23 cm



Phaius tankervillae



Familia: Orchidaceae

Origenes: India y China

Luz: Brillante Indirecta

Riego: Moderado

Temperatura: 16–21 >°C

Substrato: Fértil y bien drenado



Guzmania lingulata



Familia
Broméliaceae



Riego
Moderado



Origenes
America



Temperatura
15-26* C



Sustrato
Bien drenado



Altura
30-40.cm (tiesto)

Vriesea splendens

Espada flamígera



Familia

Bromeliaceae



Luz

Indirecta



Orígenes

América tropical



Riego

Moderado



Sustrato

Bien drenado



Temperatura

15–28 °C

Aechmea fasciata

Flor de tanque



Familia

Bromellaceae



Origenes

Sudamerica



Sustrato

Bien drenado



Luz

Indirecta



Riego

Moderado



Altura

40-50 m (tiesto)

Neoregedia carolinae



- FAMILIA:** Bromeliaceae
ORÍGENES: Sudamérica
LUZ: Intensa indirecta
RIEGO: Moderado, llenar roseta
TEMPERATURA: 15-24°C
SUSTRATO: Ligero, bien drenado
ALTURA: 30-50 cm

Cryptanthus bivittatus



FAMILIA:	Bromeliaceae
ORÍGENES:	Sudamérica
LUZ:	Intensa indirecta
RIEGO:	Moderado
TEMPERATURA:	15-24 °C
ALTURA:	15-25 cm

Billbergia nutans

Lágrimas de reina



- FAMILIA:** Bromeliaceae
ORÍGENES: Sudamérica
LUZ: Intensa indirecta
RIEGO: Moderado
TEMPERATURA: 15–24°C
SUSTRATO: Ligero, bien drenado

Tillandsia cyanea

Pluma rosa



Familia:
Bromeliáceas

Orígenes:
Ecuador, Perú

Temperatura:
15-25 °C

Luz:
Muy luminosa

Riego:
Moderado

Substrato:
Ligero, bien drenado

Altura:
Hasta 50 cm



Quesnelia testudo



Familia:
Bromellàceas

Origenes:
Brasil

Temperatura:
18-27 °C

Luz:
Muy luminosa

Riego:
Moderado

Substrato:
Ligero blen
drenao

Altura: Hasta 70 cm

Canistropsis billbergioides



Familia:
Bromelláceas

Origenes:
Brasil

Temperatura:
16-24 °C

Luz:
Muy luminosa

Riego:
Moderado

Substrato:
Ligero, bien
drenado

Aitura: Hasta 70 cm

Ananas comosus 'Variegata'

Piña ornamental



FAMILIA

Bromeliaceae

ORIGENES

Sudamérica

LUZ

Alta, tolera la luz solar directa

RIEGO

Moderado, dejar secar ligeramente el sustrato entre riegos

TEMPERATURA

15–50°C

ALTURA

30–60 cm

Euphorbia trigona

Cactus africano



FAMILIA

Euphorbiaceae

ORÍGENES

Africa

LUZ

Alta. tolera la luz solar directa

RIEGO

Escaso, dejó secar el sustrato entre riegos

TEMPERATURA

15-30 °C


ALTURA

100- 250 cm



Cereus peruvianus

Cactus de columna



FAMILIA

Cactaceae

ORÍGENES

Sudamerica

LUZ

Alta, tolera la luz solar directa

RIEGO

Escaso, dejando sécar el sustrato

TEMPERATURA

10–30 °C

ALTURA

100–200 cm

Opuntia microdasys

Orejas de conejo



FAMILIA

Cactaceaea

LUZ

Alta, tolera la luz solar directa

TEMPERATURA

10–35°C

ORÍGENES

Mexico

RIEGO

Moderado, dejar sear el sustrato entre riegos

ALTURA

30–60 cm

Astrophytum myriostigma

Orejas de conejo



FAMILIA

Cactaceae

LUZ

Alta tolera la luz solar directa

TEMPERATURA

16–35°C

ORÍGENES

Mexico

RIEGO

Escaso dejando secar el sustrato

ALTURA

30–60 cm

Mammillaria elongata

Cacto



FAMILIA

Cactaceae

LUZ

Alta, tolera la luz solar directa

TEMPERATURA

10–30 °C

ORÍGENES

México

RIEGO

Escaso, dejando secar el sustrato

ALTURA

15–30 cm

Gymnocalycium mihanovichii

Cactus injertado



- **Familia:**
Cactaceae
- **Origenes:**
Sudamerica
- **Luz:**
luz brillante
indirecta
- **Riego:**
moderado
- **Temperatura:**
18-26 °C
- **Substrato:**
bien drenado
- **Altura:**
10-15 cm



Ferocactus glaucescens

FICHA TÉCNICA

Familia:	Cactaceae
Orígenes:	Mexico
Luz:	Sol directo
Riego:	Moderado
Temperatura:	17 - 25 +C
Substrato:	Tierra para cactáceas
Altura:	15-20 cm



Schlumbergera truncata – Cactus de Navidad

FICHA TÉCNICA

Familia:	Cactaceae
Orígenes:	Brasil
Luz:	Luz indirecta
Riego:	Moderado
Temperatura:	15 – 25 °C
Substrato:	Tierra para cactáceas
Altura	20-40 cm



Rhipsalis pilocarpa



Familia
Cactacea



Luz
brillante
indirecta



Origenes
Brasil



Temperatura
16-24 °C



Riego
moderado



Substrato
poroso, bien
drenado

Altura de la planta en tiesto
30 cm

Austrocylindropuntia subulata



Familia: Cactaceae

Origen: Perú y Ecuador

Luz: A pleno sol

Riego: Escaso

Temperatura:
5-30 °C

Substrato: Arenoso,
bien drenado

Altura: 40-100 cm

Ravenala madagascariensis

Árbol del viajero miniatura



Familia:
Strelitziaceae

Origen:
Madagascar

Luz: A pleno sol

Riego: Moderado

Temperatura:
15–30 °C

Substrato: Arcilloso,
bien drenado

Altura: 60–100 cm



Tacca chantrieri

Flor murciélago



Familia:
Dioscoreaceae

Origen:
Sudeste asiático

Luz: Sombra parcial

Riego:
Moderado

Temperatura:
18–26 °C

Sustrato: Rico en
humus, bien
drenado

Altura: 60–90 cm

Selaginella kraussiana

Musgo de terciopelo



Familia: Selaginellaceae

Origenes: Madeira, Azores, África oriental

Luz: Luz intensa sin sol directo

Riego: Regular, manteniendo
el sustrato húmedo

Temperatura: 15~24°C

Substrato: Poroso/húmedo,
con materia
orgánica

Altura:
10~20 cm



Oxalis triangularis

Trébol morado



Familia: Oxalidaceae

Orígenes: Sudamérica

Luz: Abundante, sin sol directo

Riego: Moderado, dejando secar la tierra

Temperatura; 15–23°C

Altura:

20–30 cm

Substrato: Ligero, bien drenado



Amorphophallus konjac

Flor voodoo



Familia: Araceae

Origenes: Asia tropical

Luz: Abundante, sin sd directo

Riego: Moderado, dejando secar la tierra

Temperatura: 18-26 °C

Sustrato: Poroso, bien drenado

Altura:

60-1 m

Acorus gramineus 'Variegatus'



FICHA TÉCNICA

Familia	Acoraceae
Orígenes	Japón. Asia oriental
Luz	Indirecta, tolera poca luz
Riego	Frecuente
Temperatura	10–25 °C.
Substrato	Universal, húmedo
Altura de la planta	30–45 cm



Musa acuminata 'Dwarf Cavendish' Platanera miniatura



Familia: Musáceas

Orígenes: Sureste de Asia

Luz: intensa sin sol directo

Riego: Moderado

Temperatura: 15–25 °C

Sustreito: Rico en materia orgánica

Altura: Hasta 2 m en tiesto

Strelitzia reginae

Ave del paraíso



Familia
Strelitziaceas



Origen
Sudafrica



Luz
Luz directa



Riega
Moderado, dejar
secar el sustrato



Temperatura
15-25°C



Substrato
Fértil y bien drenado



Altura
1-15 m



Farfngium japonicum 'Aureomaculatum'



Familia: Asteraceae

Origenes: Japón

Luz: Luz indirecta

Riego: cuando la tierra esté parcialmente seca

Temperatura: 10-24°C

Substrato: bien drenado

Altura: 10-20 cm

Ctenanthe setosa

Ficha técnica



Familia: Marantáceas

Orígenes: Brasil


Luz: Indirecta o
semisombra

Riego: Moderado

Temperatura:
15–27°C

Sustrato:
bien drenado

Altura: 0.8–1 m
(en tiesto)



Aspidistra elatior

‘Milky Way’

Ficha técnica



Familia: Asparagáceas

Orígenes: Japón,
Taiwán

Luz: Escasa

Riego: Moderado

Temperatura: 5–30 °C

Sustrato: Bien
drenado

Altura: 0.6-1 m
(en tiesto)



Boea hygroskopica

Ficha técnica

Familla: Orminoideas

Orígenes: Asia

Luz: Moderada

Riego: Moderado

Temperratura: 24°C

Sustrato: Humedo

Altura: 0.2-05 m
(en tiesto)





Platycerium bifurcatum

Cuerno de alce

Familia
Polypodiaceae

Luz
Luz inditecta

Origenes
Australia, Nueva Guinea

Temperatura
12-26 °C

Riego
Moderado

Substrato
Ligero, bien drenado

Altura de la planta en tiesto
Hasta 80 cm



Soleirolia soleiroi

Lágrimas de ángel

Familia Liriacaceae	Luz Luz indirecta
Origenes Region mediterránea	Temperatura 12-24°C
Riego Frecuente	Substrato Rico en materia orgánica

Altura de la planta en tiesto
Hasta 20 cm



Pilea glauca

Plata caída

Familia Urticaceae	Origen Caribe
Riego Moderado	Temperatura 16-24°C
Luz Luz indirecta	Sústrato Ligero, bien drenado

Altura de la planta en tiesto
Hasta 23 cm

FITTONIA ALBIVENIS

– PLANTA NERVIOSA –



FAMILIA

Acanthaceae

ORÍGENES

Selvas tropicales
de Sudamérica

LUZ

Luz indirecta brillante

TEMPERATURA

18–26 +c.

RIEGO

Moderado: mantener
el sustrato ligeramente
humedo

SUSTRATO

Ligero y bien drenado

ALTURA

20-cm (en tiesto)

Helxine soleirolii 'Aurea'



Familia:	Urticáceas
Origenes:	Mediterráneo
Luz:	Brillante, indirecta
Riego:	Moderado
Temperatura:	10–24 °C
Substrato:	Ligero, bien drenado
Altura (en tiesto):	10 cm



Oxalis debilis 'Iron Cross'

FICHA TÉCNICA



Familia
Oxalidáceas



Luz
Luz indirecta alta



Origenes
Sur de Sudamérica



Temperatura
15-30 °C



Riego
Moderado



Sustrato
Ligero bien drenado



Altura de la planta en tiesto
20-25 cm

Hypoestes phyllostachya

Planta confeti

FICHA TÉCNICA



Familia

Acantfiaceas



Luz

Luź indirecta alta



Origenes

Madagascar



Temperatura

15–30 °C



Riego

Moderado



Sustrato

Ligero bien
drenado



Altura de la planta en tiesto

20–40 cm

Anthurium crystallinum

FICHA TÉCNICA



Familia
Araceae



Luz
Luz indirecta
alta



Origenes
Zonas tropicales
de America



Temperatura
18-25-°C



Riego
Moderado



Sustrato
Ligero bien
drenado



Altura de la planta en tiesto
30-60 cm